Plano anual de gestão integrada para controlo e monitorização da lagarta do pinheiro Thaumetopea pityocampa

	Janeiro		Marco	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro Outubro	Novembro I	Dozombro
	Janeiro	Fevereiro	Março	ADIII	IVIdIO	Julillo	Julio	Agosto	Setembro Outubro	Novembro	Jezembro
Identificação de locais a intervir											
Levantamento cartográfico das árvores em espaço urbano e periurbano											
Definir outros locais prioritários ou áreas florestais afetadas											
Validação da informação no terreno											
Método de controlo meio de luta cultural											
Colocação de cintas/bandas com cola específica inodora (poli-isolbutadieno) em redor do tronco a uma altura fora do alcance das											
pessoas - captura das lagartas na fase de descida da copa da árvore para o solo (utilizar apenas em situações pontuais e caso se											
justifique)											
Vigilância e manutenção das cintas/bandas - periodicidade semanal (2 a 3 semanas)											
Destruição de lagartas em procissão e pupas no solo; Cavar o solo de modo a expor as pupas já formadas ou as lagartas que											
conseguiram enterrar-se (10 a 15 cm) (usar EPI - Equipamento de Proteção Individual)											
Método de controlo meio de luta biológica											
Aquisição ou Construção de caixas-ninho para o chapim-real e chapim-azul (época de reprodução é de março a junho) - envolver a											
comunidade escolar (alunos do 4º ano e 2ºCEB) na construção das caixas-ninho											
Instalação de caixas-ninho construídas - 3 a 5 metros de altura do solo - em locais previamente definidos											
Monitorização das populações - periodicidade semanal (1 a 2 vezes por semana)											
Manutenção das caixas ninho											
Método de controlo meio de luta biotécnica											
Colocação de armadilhas tipo funil yerde e transparente com feromonas em cápsulas (2 a 3 armadilhas/hectare) - para captura da											
borboleta - a 1,5 -2 metros de altura do solo; a persistência da feromona é de 6 semanas. A conservação da feromona é obtida pela											
colocação das cápsulas no frigorífico, podendo nessas condições manter as suas qualidades durante 2 anos.											
Monitorização das armadilhas - periodicidade semanal (3 a 4 vezes por semana) - contagem de individuos capturados para permitir											
traçar a curva de voo dos machos na zona											
Monitorização de posturas (sempre que possível) na copa das árvores, em locais representativos (3 a 4 vezes por semana)											
Método de controlo meio de luta química (aplicar em situações pontuais e caso se justifique)											
Selecção de árvores para tratamento - medir o PAP e DAP (1,30m), PAB (0,30m)											
Tratamento químico da copa em árvores com DAP < 15 cm com pulverizador de dorso; recorrer de preferência a um inseticida											
microbiológico com Bacillus thuringiensis (Bt) - atender ao período de atuação e outras especificidades do produto; em alternativa											
usar um (em tratamentos terrestres usar 200 g/ha em alto volume) - os tratamentos devem realizar-se de preferência sobre as											
posturas. Após a eclosão dos ovos, aplicar o produto sobre as lagartas nos primeiros instares.											
Endotratamento - tratamento fitossanitário com produtos fitofarmacêuticos homologados com a substâncias ativa abamectina -											
aplicação de microinjeção no tronco; aplicação do produto durante os três primeiros instares da lagarta (melhor eficácia); atua por											
ingestão quando as larvas se alimentam das agulhas, não permitindo que a lagarta se desenvolva; o n.º de injeções está dependente											
do PAP (Perímetro à Altura do Peito); periodicidade do endotratamento de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos a avaliar através da											
monitorização da eficácia dos tratamentos											
Monitorização da eficácia do tratamentos											
Avaliação do plano	_										
						Gabinete Técnico	Florestal intere	nunicinal			
Revisão do plano e elaboração de relatório até 31 de janeiro do ano civil seguinte						Vila Nova da Barq					
Observação: Indicadores anuais a incluir no relatório > N.º de machos/borboletas capturadas % de árvores com ninhos						Município de Vila					ENTRONCAMENTO
						Praça da Republio					
						2260-411 Vila No				D - 1	3
						Tel.: 249720350 e-mail: gtf@cm-v				Darquinha	and Comment
						c-mail. gti@till=V	nvaryumna.pt				

e-mail: gtf@cm-vnbarquinha.pt